

A.P.O.L.C. - OP

SOCIETA' COOPERATIVA.
LAMEZIA TERME

COMUNITA' EUROPEA- MINISTERO RISORSE AGRICOLE-AGEA
(Reg. UE 611/14 e Reg. UE 615/14)
CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELLA COMUNITA' EUROPEA E DELL'ITALIA

MONITORAGGIO: CICLOCONIO - COCCINIGLIA

Ai sensi del Reg. UE 611/14 e REG UE 615/14 Ambito D Misura A e Ambito B Misura B – l'Organizzazione per l'annata 2017-2018 ha predisposto il monitoraggio e controllo del parassita sopra indicato e del miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura nei Comuni sotto riportati

BOLLETTINO N 31

VALIDITA' dal 12 MARZO AL 20 MARZO 2018

MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA PRODUZIONE-Ambito-D- Misura A PROVINCIA DI CATANZARO VIBO VALENTIA e COSENZA

Dai rilievi effettuati nelle stazioni monitorate dei Comuni di:

FEROLETO ANTICO, PIANOPOLI, CORTALE, SERRASTRETTA, SORIANO C.BRO, GEROCARNE, LAMEZIA TERME, MAIDA, CLETO, SAN PIETRO A MAIDA NOCERA T.SE, FALERNA, GIZZERIA, FRANCAVILLA ANGITOLA, CURINGA : Attraverso le analisi effettuate sui campioni di foglie prelevate, adottando il metodo Tenerini-Loprieno, in alcuni oliveti a causa dell'alta umidità atmosferica e temperatura idonea allo sviluppo del fungo l'infestazione è superiore alla soglia d'intervento. Negli areali ove non sono stati eseguiti trattamenti nelle precedenti settimane la presenza del parassita è ai limiti della soglia di intervento. Allo stato non è stata riscontrata la presenza di neanidi di I e II età di cocciniglia.

ILCOORD. RESP. PROGETTO

IL TECNICO

MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE Ambito B- Misura B

In questo periodo, si consiglia la lavorazione superficiale del terreno e concimazione al fine di apportare al terreno gli elementi nutritivi asportati con le produzioni. In generale essendo la dotazione di azoto al di sotto dei valori medi non si può ripristinare con la sola concimazione minerale ma è auspicabile intervenire con adeguata concimazione organica. A tal fine è opportuno distribuire concimi misto – organici. Nelle aziende olivicole ove non è stata eseguita affatto la lotta contro il cicloconio negli ultimi mesi si consiglia un trattamento a base di dodina (curativo) ove è stata superata la soglia di intervento, mentre nelle altre non trattate con soglia al di sotto di quella di intervento eseguire un trattamento a base di prodotti rameici. Si raccomanda di rispettare le dosi indicate dalle varie case produttrici. Relativamente alla cocciniglia non si consiglia alcun trattamento.

IL COORD.RESP.PROGETTO

IL TECNICO